

Hip Revision Masterclass

1° Memorial Claudio Saltelli

Programma preliminare

Chairman: Dr Massimo Laus, BO
Special Guest: Prof Peter Ritschl, Austria

Bologna
Venerdì, 21 ottobre 2016



Al fianco dei professionisti sanitari da oltre 150 anni

Strategie e risultati nelle infezioni croniche delle protesi d'anca

*M. Cappa, *E. Sabetta,
**S. Stea, **B. Bordini

**Struttura Complessa
Ortopedia e Traumatologia
Direttore: Ettore Sabetta*

*I.R.C.C.S. Arcispedale S. Maria Nuova
Reggio Emilia*

***R.I.P.O. Bologna*

<https://ripo.cineca.it>

ANCA – infezioni RER (Regione Emilia Romagna)

- 64.916 interventi primari su residenti RER tra il 2000 e il 2014
- Revisionati 2.817 casi (4.3 %) di cui 168 per sepsi (6 %).
 - ◆ 60 entro 12 mesi (35,7 %)
 - ◆ 108 dopo 12 mesi (64,3%)

ANCA – infezioni RER

- 108 casi su residenti RER tra il 2000 e il 2014
 - ◆ 77 casi espianto totale
 - ◆ 16 casi espianto parziale
 - ◆ 15 casi espianto e reimpianto

77/108 espianto totale (2000-2014)

- Espianto in media a 4.5 anni (min. 12 mesi, max 12.8 anni)
- 40 casi spaziatore cemento antibiotato
- 37 casi espianto semplice

Al 31/08/2016

- *49 reimpiantati in media dopo 5.6 mesi (45 esito positivo; 4 nuova revisione in media dopo 1.8 anni)*
- *17 non reimpiantati in media dopo 6.6 anni*
- *11 deceduti (non nota la causa)*

16/108 espianto parziale (2000-2014)

- Espianto in media a 4 anni (min. 12 mesi, max 10.7 anni)

Al 31/08/2016

- *13 reimpiantati in media dopo 6 mesi (esito positivo con f-up medio di 5.8 anni)*
- *2 espianto della componente lasciata in sede (1 caso dopo 2 mesi; 1 caso dopo 6 mesi)*
- *1 caso non ancora reimpiantato dopo 2.4 anni (1/2 protesi ancora in sede!!!)*

15/108 revisioni in un tempo (2000-2014)

- intervento in media a 4.2 anni (min. 12 mesi, max 7.5 anni)

Al 31/08/2016

- *12 esito positivo con f-up medio di 6.2 anni*
- *3 nuova revisione con diagnosi diversa dalla settica (!) a 1.9 anni dalla prima revisione*

Casistica ASMN Reggio Emilia

Gennaio 2007- Dicembre 2015

Interventi per infezione comparsa > 24 mesi dall'impianto

- 7 pazienti (1 bilaterale)
- Intervento in media 7 aa dopo l'impianto (min 3 aa, max 11 aa)
- 4 espianto + blocco spaziatore, quindi reimpianto: paz 1 (2 mesi, staf aureo MS, deceduto dopo 7 mesi), paz 2 (6 sett, staf aureo MS, guarito), paz 3 (staf aureo MR, 16 mesi, reinfezione e. coli ESBL, espantata inizio 2016), paz 4 (12 sett, peptostreptococcus anaerobius, guarito)
- 3 Solo espianto: paz 5 (staf aureo MR), paz 6 (bilat, staf aureo MS), paz 7 (staf aureo MS)